


Grafieken vleesconserven

Achtergrond


Bij deze productgroep is gekeken naar de mogelijkheden van reductie van het toegevoegd natrium en het verzadigd vetgehalte. De productgroep is onderverdeeld in vier subcategorieën: vleesproducten in opgiet, rookworst, ragout(achtigen) en vleeswaren in blik. Van alle subcategorieën zijn productspecificaties verzameld van het verzadigd vet- en natriumgehalte. De grafieken met informatie over het verzadigd vetgehalte zijn niet opgenomen, omdat dat deze informatie voor de voorstellen niet relevant is.

1. Vleesproducten in opgiet (natrium)




Natrium	Reductie 10% tov huidige gemiddelde
Gemiddelde: 834 mg	Nieuw gemiddelde: 751 mg
Minimum: 590 mg	Nieuw maximum: 760 mg
Maximum: 1.100 mg	

2. Rookworst (natrium)



Natrium	Reductie 5% tov huidige gemiddelde
Gemiddelde: 936 mg	Nieuw gemiddelde: 889 mg
Minimum: 860 mg	Nieuw maximum: 892 mg
Maximum: 1.140 mg	


3. Ragoutachtigen (natrium)



Natrium	Reductie 10% tov huidige gemiddelde
Gemiddelde: 443 mg	Nieuw gemiddelde: 400 mg
Minimum: 400 mg	Nieuw maximum: 400 mg
Maximum: 1.000 mg	

* uitschieter (1.000 mg) niet meegenomen in de berekeningen

4. Vleeswaren in blik (natrium)



Natrium
Gemiddelde: 857 mg
Minimum: 700 mg
Maximum: 1.980 mg

* uitschieter (1.980 mg) niet meegenomen in de berekeningen